HUMEX

MAL DE GORGE

PASTILLES SANS SUCRE
Biclotymol 20 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMÉDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.

HUMEX MAL DE GORGE MENTHE 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt

HUMEX MAL DE GORGE FRUITS ROUGES 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt et à l'acésulfame potassique

• *La substance active est :*
Biclotymol..... 20,00 mg
Pour une pastille

• *Les autres composants sont :*
Pastilles menthe : Isomalt, lévomenthol.
Pastilles fruits rouges : Isomalt, acide citrique monohydraté, acésulfame potassique, arôme framboise 054428 A, arôme mûre 26 D 272.

Exploitant :
Laboratoires URGO
42 rue de Longvic
21300 CHENOVE - FRANCE

QU'EST-CE QUE HUMEX MAL DE GORGE 20 mg SANS SUCRE, pastille ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament se présente sous forme de pastille en boîte de 24 pastilles.

Pastilles à sucer à base d'antiseptique.
Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER HUMEX MAL DE GORGE 20 mg SANS SUCRE, pastille ?

N'utilisez jamais HUMEX MAL DE GORGE 20 mg SANS SUCRE, pastille :
• *en cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants de la pastille.*

Mise en garde :
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.
L'usage prolongé (plus de 5 jours) n'est pas souhaitable, car il est susceptible de modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.

Précautions d'emploi :
En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments comme en cas d'aggravations ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : CONSULTER VOTRE MEDECIN.

HUMEX

MAL DE GORGE

PASTILLES SANS SUCRE
Biclotymol 20 mg

Grossesse / Allaitement :

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser le biclotymol pendant la grossesse.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

L'utilisation simultanée ou successive d'antiseptiques est à éviter compte-tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation).

Ce médicament contient du biclotymol.
D'autres médicaments en contiennent ;
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi, posologie).

COMMENT UTILISER HUMEX MAL DE GORGE 20 mg SANS SUCRE, pastille ?

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.
Adultes : 1 pastille 4 à 6 fois par jour, en répartissant les prises.
Enfants de plus de 6 ans : 1 pastille à renouveler si nécessaire, sans dépasser 3 pastilles par jour.
Laisser fondre lentement dans la bouche (voie buccale).

La durée du traitement est limitée à 5 jours.

Si vous avez utilisé plus de HUMEX MAL DE GORGE 20 mg SANS SUCRE, pastille que vous n'auriez dû : *consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.*

Si vous oubliez de prendre HUMEX MAL DE GORGE 20 mg SANS SUCRE, pastille : *ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.*

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ***HUMEX MAL DE GORGE 20 mg SANS SUCRE, pastille*** *est susceptible d'avoir des effets indésirables.*
Signalez à votre médecin ou pharmacien tout effet non souhaité et gênant.

COMMENT CONSERVER HUMEX MAL DE GORGE 20 mg SANS SUCRE, pastille ?

Pas de précautions particulières de conservation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 14 avril 2006.

712 990
6049N-Frtsrges;mthe-FrB